

SPIRIVA RESPIMAT INHALER

Mengandung zat aktif *Tiotropium Bromida* 2,5 mcg

Untuk terapi pemeliharaan pada pasien dengan Penyakit Paru Obstruktif Kronis, termasuk bronkitis kronis, emfisema, dan pada pasien dengan asma berat

Efek samping : pusing, mulut kering, penglihatan kabur

Cara penyimpanan : simpan di tempat sejuk dan kering serta terlindung dari cahaya

Bagaimana cara menggunakannya?



1. Lepas bagian dasar transparan (biarkan penutup tetap tertutup) lalu tekan kunci pengaman sambil menarik bagian dasar yang transparan



2. Memasukkan cartridge dengan cara dorong ujung cartridge yang kecil ke dalam inhaler. Letakkan inhaler di atas permukaan yang keras dan dorong kuat



3. Pasang kembali dasar transparan hingga terdengar bunyi klik



4. Putar

Pastikan penutup dalam posisi tertutup, putar bagian dasar sesuai arah panah yang terdapat pada label hingga terdengar bunyi klik (setengah putaran)



5. buka penutup hingga terbuka seluruhnya



6. Tekan
- arahkan leher ke bawah
- tekan tombol pelepas obat
- tekan penutup
- ulangi langkah 4-6 hingga terlihat kabut
- setelah kabut terlihat, kemudian ulangi langkat 4-6 sebanyak 3 kali

Penggunaan sehari - hari



Pastikan penutup dalam posisi tertutup, putar bagian dasar sesuai arah panah yang terdapat pada label hingga terdengar bunyi klik (setengah putaran)



Buka penutup hingga terbuka seluruhnya



- Buang nafas dengan lambat dan dalam
- katupkan bibir anda pada ujung corong - tetapi jangan penutup lubang udara
- tarik napas dengan lambat dan sambil tekan tombol pelepas obat
- tahan napas anda selama kurang lebih 10 detik
- ulangi putar, buka, tekan untuk total 2x semprot

Referensi

pionas.pom.go.id

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Informasi Layanan dan Pengaduan
Scan QR Barcode

CARA PENGGUNAAN SPIRIVA RESPIMAT INHALER



Daftar Leaflet
Scan QR Barcode

PKRS/027/01/2026/00